

Jelöljük a nagyítás után kapott háromszög csúcsait rendre K, L, M -mel, ahol K a P -vel szemközti csúcs. Tudjuk, hogy az ABC háromszög az RQP háromszög S súlypontjából $-\frac{1}{2}$ arányú kicsinyítéssel jött létre, azaz e két háromszög súlypontja megegyezik. Jelölje a PB súlyvonal és AC oldal metszéspontját P_1 , ekkor $PP_1 = \frac{1}{2}PB$, $PS = \frac{2}{3}PB$, ahonnan $PS = 4P_1S$. Az LM szakasz metszi a PP_1 szakaszt, és így a PQR háromszög PA, PC oldalszakaszait is. Ez pedig azt jelenti, hogy a $D_1D_2E_1E_2F_1F_2$ valódi (konvex) hatszög. Ha viszont $k \leq 1$, akkor a KLM képháromszög kisebb, mint az eredeti ABC háromszög; ha pedig $k \geq 4$, akkor a képháromszög tartalmazza a PQR háromszöget, a megfelelő oldalak nem metszik egymást, nem jön létre hatszög.

1985-01-019-1.eps

1. ábra

Legyen tehát $1 < k < 4$, és jelöljük a PP_1 és D_1F_2 szakaszok metszéspontját P_2 -vel. Az ABC és MKL háromszögek hasonlósága miatt

$$\frac{P_2S}{P_1S} = k,$$

és így

$$\frac{PP_2}{P_1S} = \frac{PS - P_2S}{P_1S} = \frac{PS}{P_1S} - \frac{P_2S}{P_1S} = 4 - k.$$

A $PD_1F_2, F_1E_2R, D_2QE_1$ háromszögek mindegyike hasonló a PQR háromszöghöz, és a hasonlóság aránya $PB = 3 \cdot BS = 3 \cdot (2 \cdot P_1S)$ alapján

$$(1) \quad \lambda = \frac{PP_2}{PB} = \frac{PP_2}{6P_1S} = \frac{4 - k}{6},$$

mindhárom esetben. A kis háromszögek tehát egybevágóak, területük a PQR háromszög területének λ^2 -szerese.

Jelöljük a PQR háromszög területét T -vel. A hatszög területét úgy kaphatjuk meg, hogy T -ből kivonjuk a 3 kis háromszög területének összegét. Ennek kell kétszer akkorának lennie, mint az ABC háromszög területe. Ám az ABC háromszög területe $T/4$, ezért a következő összefüggésnek kell fennállnia: $T - 3\lambda^2T = T/2$, azaz $\lambda^2 = 1/6$. A λ helyébe az (1) szerinti $(4 - k)/6$ -ot helyettesítve $(4 - k)^2 = 6$, amit az $1 < k < 4$ feltétel mellett csak a $k = 4 - \sqrt{6}$ érték elégít ki.

Így k értéke csak $4 - \sqrt{6}$ lehet. Ha k -t ennyinek választjuk, (1) alapján az egybevágó $PD_1F_2, F_1E_2R, D_2QE_1$ háromszögek a PQR háromszögből $\lambda = \sqrt{6}/6$ arányú kicsinyítéssel jönnek létre, tehát a hatszög területe

$$T - 3\lambda^2T = T - \frac{1}{2}T = \frac{1}{2}T,$$

valóban megegyezik az ABC háromszög területének kétszeresével.

Megjegyzések. 1. A feltételként kapott $(4 - k)^2 = 6$ egyenletet a $k = 4 - \sqrt{6}$ értéken kívül a $k = 4 + \sqrt{6}$ is kielégíti. Mi lehet ennek a második megoldásnak a geometriai jelentése? Az ABC háromszöget $(4 + \sqrt{6})$ -szorosára kinagyítva, a kapott MKL háromszög oldalai nem metszik a PQR háromszög *oldalszakaszait*, hanem csak *oldalegyeneseit*. A keletkezett $D_1D_2E_1E_2F_1F_2$ idom „hurkolt” hatszög. Ha ennek „területét” úgy definiáljuk, hogy a PQR háromszög területéből *levonjuk* a vonalkázott „hurkok” területét, akkor erre a hatszögre is teljesül, hogy „területe” kétszerese az ABC háromszög területének (2. ábra).

1985-01-019-2.eps

2. ábra

2. A maximális pontszámot azok kapták meg, akik azt is indokolták, hogy a $(4 - k)^2 = 6$ egyenlet megoldásaként adódó $k = 4 - \sqrt{6}$ miért megoldása a feladatnak is (és nemcsak ennek az egyenletnek), illetve hogy a másik, $k = 4 + \sqrt{6}$ miért nem megoldás.