

A formula szimmetriája miatt feltehetjük, hogy: $A^2 + B^2 \geq C^2 + D^2$.
Ekkor azt kell bizonyítani, hogy: $A^2 + B^2 - C^2 - D^2 \leq 2AB + 2CD$. Rendezve:

$$0 \leq C^2 + D^2 + 2CD - (A^2 + B^2 - 2AB) = (C + D + A - B)(C + D - A + B).$$

Jelölje a tetraéder térfogatát V , beírt gömbjének sugarát r , a lapokhoz tartozó magasságokat pedig m_a, m_b, m_c, m_d .
Ekkor $3V = r(A + B + C + D)$.

Egy tetraéderben a beírt gömb átmérője kisebb mindegyik magasságnál, mert egy laptól a szemközti csúcs távolabb van, mint a gömb bármely pontja.

Így $2r \leq m_a$, azaz

$$A \cdot m_a = 3V = r(A + B + C + D) \leq \frac{m_a}{2}(A + B + C + D), 2A \leq A + B + C + D, 0 \leq C + D - A + B.$$

Hasonlóan igazolható, hogy $0 \leq C + D + A - B$.

Innen: $0 \leq (C + D - A + B)(C + D + A - B)$, ami éppen a bizonyítandó állítással egyenértékű.

Szabó Gábor (Bonyhád, Petőfi S. Evang. Gimn., III. o.)

Megjegyzés. *Terék Zsolt* (Fazekas M. Főv. Gyak. Gimn.) merőleges vetítésekkel, *Jalovszky Tamás* (Révkomárom, Ipari Középiskola) pedig a tetraéder hozzáírt gömbjeinek segítségével oldotta meg a feladatot.