

**I. megoldás.** Azt fogjuk megmutatni, hogy adott  $r$  sugarú kör köré írható két egyenlő szárú, nem egybevágó, egyenlő területű háromszög. Az 1. ábrán az egyik ilyen háromszöget rajzoltuk meg, amelynek alapja  $2b$ , szára pedig  $a$ . Nyilván megválasztható  $a$  és  $b$  úgy, hogy  $a : b = 3 : 1$  legyen, hiszen egy ilyen háromszögbe írható kör, és a kapott ábrát megfelelően nagyítva a beírt kör sugara  $r$  lesz. Ezután az egységet úgy választjuk meg, hogy  $b = 1$  legyen. Ismeretes, hogy a háromszög területe  $t = r \cdot s$ , ahol  $s$  a félkerület. Ezért, ha két háromszög területe és beírt köre egyenlő, akkor a kerületük is egyenlő. Ennek alapján a másik háromszöget úgy próbáljuk meghatározni, hogy alapjának fele, illetve szára  $b' = 1 + x$ , illetve  $a' = 3 - x$  legyen, tehát a kerületek egyenlők, és a területek is egyezzen meg. Az  $ABC$  háromszög alaphoz tartozó magassága  $\sqrt{9 - 1} = \sqrt{8}$ , a másik háromszögé  $\sqrt{(3 - x)^2 - (1 + x)^2} = \sqrt{8 - 8x}$ , a területek egyenlőségének a feltétele:

$$(1) \quad 1 \cdot \sqrt{8} = (1 + x)\sqrt{8 - 8x}, \quad \text{amiből} \quad x = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

Ezért a második háromszög oldalai  $2b' = 2(1 + x) = \sqrt{5} + 1$ ,  
 $a' = 3 - x = \frac{7 - \sqrt{5}}{2}$ .

A  $b'$  és  $a'$  választása és (1) következtében a két háromszög kerülete és területe egyenlő, de akkor a beírt körök sugara is megegyezik, és a háromszögek nem egybevágók. Így a feladat kérdésére „igen”-nel válaszolhatunk.

*Pintér Dömötör* (Szombathely, Nagy Lajos Gimn., IV. o.t.)

**II. megoldás.** Legyen az adott kör sugara 1. A 2. ábrán látható egyenlő szárú háromszöget egyértelműen meghatározza a  $\varphi$  szög. A háromszög területét a három derékszögű deltoid területének összegeként kiszámítva:  $t(\varphi) = \text{tg} \frac{\varphi}{2} + 2 \cdot \text{ctg} \frac{\varphi}{4}$ , ahol  $0^\circ < \varphi < 180^\circ$ . Ismeretes, hogy adott kör köré írt háromszögek közül a legkisebb kerületű a szabályos, ezért a  $t(\varphi)$  függvénynek a  $\varphi = 120^\circ$  helyen minimuma van. A minimum értéke  $3\sqrt{3}$ . A függvény a  $(0^\circ; 180^\circ)$  nyílt intervallumban folytonos, a  $\varphi = 0^\circ$  helyen vett jobb oldali, illetve a  $\varphi = 180^\circ$  helyen vett bal oldali határértéke egyaránt  $+\infty$ , ezért a függvény a  $(0^\circ; 120^\circ)$  és  $(120^\circ; 180^\circ)$  intervallumokban minden  $3\sqrt{3}$ -nál nagyobb értéket felvesz. Lesz tehát a két intervallum egyikében olyan  $\varphi_1$ , a másikban olyan  $\varphi_2$ , amelyekre  $t(\varphi_1) = t(\varphi_2)$ , és a két szöghöz tartozó két háromszög nem egybevágó. Sőt, végtelen sok ilyen háromszögpár van.

*Terék Zsolt* (Fazekas M. Főv. Gyak. Gimn., III. o.t.)

*Megjegyzések.* 1. *Szita István* (Körmend, Kölcsey F. Gimn., IV. o.t.) a  $t(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 1}$  függvényt vizsgálta, ahol  $x$  a kör köré írt egyenlő szárú háromszög alapjának a fele,  $t(x)$  pedig a területe. Egyik megoldásában megmutatta, hogy  $t(x)$  értékkészletének minden  $3\sqrt{3}$ -nál nagyobb elemét pontosan kétszer veszi fel, ezért létezik két különböző, egyenlő területű háromszög. Egy másik megoldásában konstruált két egyenlő területű háromszöget.

A feladat megoldásai összességükben is úgy oszlottak meg, hogy voltak konstruktív megoldások, mint az 1. megoldás, és voltak egzisztenciát igazolók, mint a második.

2. A 2. megoldásban felhasználtuk azt a tényt, hogy a vizsgált függvény minden  $3\sqrt{3}$ -nál nagyobb értéket felvesz (két intervallumban is). Pontosán megfogalmazva a következő tétel alkalmazásáról van szó: Ha az  $f(x)$  függvény az  $[a; b]$ -ben folytonos, akkor az  $[a; b]$  intervallumon fölvesz minden  $f(a)$  és  $f(b)$  közötti értéket.



