

*I. Megoldás.* Ha a derékszögű négyszög oldalai  $a$ ,  $b$ ; a kérdéses hatszög egyik oldala  $x$ , akkor

$$(a-x)^2 + (b-x)^2 = x^2,$$

mely egyenletből

$$x = a + b \pm \sqrt{2ab}.$$

A négyzetgyököknek csakis a negatív értéke jöhet tekintetbe, mert  $x < a + b$ .

A feladat akkor oldható meg, ha

$$a + b - \sqrt{2ab} < a \text{ és } a + b - \sqrt{2ab} < b,$$

miből

$$b < 2a \text{ és } a < 2b$$

vagy

$$\frac{b}{a} < 2 \text{ és } \frac{b}{a} > \frac{1}{2}.$$

*II. Megoldás.* Legyen az adott téglalap  $ABCD$ . A feladat értelmében  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  és  $DA$  oldalakon oly  $E$ ,  $F$ ,  $G$  és  $H$  pontok keresendők, hogy  $EB = BF = FG = DG$ . Az  $E$  és  $H$  pontokat a következő szerkesztéssel nyerjük:

$A$ -ból  $AD$  sugárral kört rajzolunk, mely  $AB$ -t  $D_1$ -ben metszi.  $D_1$ -ből a  $D_1A$  sugárral vont kör  $BD$  átlót  $A_1$ -ben metszi.  $AD_1A_1$  háromszöget egészítsük ki rhombussá, melynek negyedik csúcsa  $B_1$ .  $B_1D$   $AB$  oldalt  $E$ -ben metszi s az ebből a pontból  $AB_1$ -gyel vont párhuzamos  $AD$  oldalt  $H$ -ban metszi.  $E$  és  $H$  pontok adják a keresett 2 pontot. Ugyanis hasonlósági tétel alapján felírhatjuk:

$$\frac{AB_1}{EH} = \frac{AD}{HD} = \frac{B_1D}{ED} = \frac{B_1A_1}{EB}$$

s így

$$EH = HD = EB.$$

(Kornis Ödön.)

*A feladatot még megoldották:* Filkorn J., Freibauer E., Glass M., Juvancz I., Kárf J., Kohn B., Krausz B., Krisztián Gy., Obláth R., Neumann J., Pollák N., Porkoláb J., Sasvári G., Sasvári J., Spitzer Ö., Tinyó J., Weisz J.