


A két  $m$  tömegű  $v_k$  sebességű golyónak az ütközést követő pillanatban mozgási energiája  $E_m = (1/2) \cdot (2 mv_k^2) = mv_k^2$ .



Mivel a golyók a felfüggesztési szintig emelkednek, itt ez egyenlő golyók helyzeti energiájával (ha a legmélyebb pontban a helyzeti energiát 0-nak tekintjük).

$$(1) \quad \begin{aligned} mv_k^2 &= 2mgh & (h \text{ az inga hossza}), \\ v_k &= \sqrt{2gh}. \end{aligned}$$

Ha az 1. golyó  $v_1$  sebességgel ütközik teljesen rugalmatlanul az álló 2. golyónak, sebességük az ütközés után a mozgásmennyiség megmaradásának törvényéből

$$(2) \quad 2mv_k = mv_1, \quad v_k = \frac{v_1}{2}.$$

Vagyis az 1. golyónak az ütközés előtti energiája  $E_p = (1/2)mv_1^2$ . A meglökés pillanatában  $(1/2)mv_0^2$  mozgási és  $mgh$  helyzeti energiával rendelkezik. Az ütközésig érvényes az energiamegmaradás törvénye, vagyis

$$(1/2)mv_1^2 = (1/2)mv_0^2 + mgh, \quad \text{így} \\ v_0 = \sqrt{v_1^2 - 2gh}.$$

(1)-et és (2)-t behelyettesítve

$$v_0 = \sqrt{6gh}.$$

Számadatainkkal a)  $v_k \approx 4,43$  m/s, b)  $v_0 = \sqrt{60}$  m/s  $\approx 7,74$  m/s.

Végh László (Debrecen, Tóth Á. g. III. o. t.)

*Megjegyzések.* 1. Rugalmatlan ütközésnél energiavesztés van. Az energiatétel nem alkalmazható.

2.  $v$  kezdősebességgel  $h$  magasságból eső test sebessége  $v_1 = \sqrt{v^2 + 2gh}$ , és nem  $v_1 = v + \sqrt{2gh}$ , mint azt többen hibásan írták.

3. Az ingamozgás nem egyenletesen gyorsuló mozgás. Nagy kitérésre a középiskolában tanult lengésidőképlet nem érvényes.

4. Ha  $g = 10$  m/s<sup>2</sup> értékkel számolunk, nincs értelme a végeredményben 5–6 tizedesnek.

5. Esetünkben  $h = 1$  m volt, ezért egyesek  $v = \sqrt{2gh}$  helyett  $v = \sqrt{2g}$  képlettel számoltak, ami dimenzióban helytelen.

6. A mozgásmennyiség megmaradásának törvénye mindig érvényes, tehát nemcsak a rugalmatlan ütközés esetében!