

Megoldás. Bármilyen is egy adott pillanatban az addig dobott számok összege – hacsak nem 4-gyel osztható, hiszen akkor a játék befejeződik –, a következő játékos tud olyan számot dobni, amellyel nyer: ha az összeg $4k + 1$ alakú, akkor 3-at, ha $4k + 2$ alakú, akkor 2-t vagy 6-ot, ha pedig $4k + 3$ alakú, akkor 1-et vagy 5-öt dobva győz.

Így minden dobáskor legalább $\frac{1}{6}$ az esélye annak, hogy a következő dobással a játék véget ér. Legfeljebb $\left(\frac{5}{6}\right)^n$ tehát annak a valószínűsége, hogy a játék n dobás után még nem ér véget, ez az érték pedig tart a nullához. A játék tehát 1 valószínűséggel véget ér.

Tegyük fel, hogy a játék egy adott állásában a dobott számok összege $4k + r$ alakú ($0 \leq r \leq 3$). Ha P_r jelöli annak a valószínűségét, hogy a soronkövetkező játékos – aki éppúgy lehet Anna, mint Zsófi, hívjuk őt X -nek – ezután valamikor győz, akkor ez a valószínűség nyilván csak az r maradéktól függ. Másfelől láttuk, hogy a játék véget ér, éppen ezért ebből a helyzetből a másik játékos, aki X után jön, $1 - P_r$ valószínűséggel nyer. Itt értelemszerűen $P_0 = 0$, hiszen X már veszített. Ha pedig X dobása nyomán $4k + r'$ lett a dobott számok összege, akkor most nem X következik, így a fentiek szerint $1 - P_{r'}$ annak a valószínűsége, hogy ő nyer. A továbbiakban ezt az egyszerű észrevételt alkalmazzuk a P_r valószínűségek felírásakor.

Vizsgáljuk meg a nemnulla maradékokat; legyen először $r = 1$, és nézzük meg, hogy a lehetséges dobásai nyomán kialakult helyzetben X milyen valószínűséggel nyeri meg a játékot. Ha 3-at dob – ennek a valószínűsége $\frac{1}{6}$ – akkor $(1 - P_0) = 1$ valószínűséggel nyer. Ha 1-et vagy 5-öt – ennek az esélye $\frac{1}{3}$ – akkor $4k + 2$ alakú számra jutva a fentiek szerint $(1 - P_2)$ valószínűséggel nyer. Hasonlóan kapjuk, hogy ha 2-t vagy 6-ot dob – ennek az esélye is $\frac{1}{3}$ – akkor $(1 - P_3)$, ha pedig 4-et dob, akkor $(1 - P_1)$ valószínűséggel nyer. Eszerint:

$$(1) \quad P_1 = \frac{1}{6}(1 - P_0) + \frac{1}{3}(1 - P_2) + \frac{1}{3}(1 - P_3) + \frac{1}{6}(1 - P_1)$$

Hasonlóan írhatók föl a P_2 és a P_3 valószínűségek:

$$(2) \quad P_2 = \frac{1}{3}(1 - P_0) + \frac{1}{3}(1 - P_3) + \frac{1}{6}(1 - P_1) + \frac{1}{6}(1 - P_2), \quad \text{illetve}$$

$$(3) \quad P_3 = \frac{1}{3}(1 - P_0) + \frac{1}{3}(1 - P_1) + \frac{1}{6}(1 - P_2) + \frac{1}{6}(1 - P_3).$$

A három egyenletet rendezve az alábbi egyenletrendszert kapjuk:

$$(1)\text{-ből:} \quad 7P_1 + 2P_2 + 2P_3 = 6.$$

$$(2)\text{-ből:} \quad P_1 + 7P_2 + 2P_3 = 6.$$

$$(3)\text{-ből:} \quad 2P_1 + P_2 + 7P_3 = 6.$$

Az egyenletrendszert megoldva kapjuk, hogy $P_1 = \frac{50}{99}$, $P_2 = \frac{60}{99}$, $P_3 = \frac{62}{99}$.

Térjünk rá ezután a két szereplő, Anna és Zsófi játékára. Ha először Anna $4k + r$ alakú számot dob, akkor a fentiek szerint $1 - P_0 = 1$ valószínűséggel győz, ha $r = 0$; és $1 - P_r$ valószínűséggel, ha $r = 1, 2, 3$. Mivel pedig $\frac{1}{6}$ valószínűséggel dob 0 vagy 3 maradékot és $\frac{1}{3}$ valószínűséggel 1-et (1 és 5), illetve 2-t (2 és 6), azért annak a valószínűsége, hogy kezdő játékosként Anna győz:

$$\frac{1}{6}(1 - P_0) + \frac{1}{3}(1 - P_1) + \frac{1}{3}(1 - P_2) + \frac{1}{6}(1 - P_3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{49}{99} + \frac{1}{3} \cdot \frac{39}{99} + \frac{1}{6} \cdot \frac{37}{99} = \frac{52}{99},$$

valamivel nagyobb, mint $\frac{1}{2}$.

Megjegyzés. Sokan elmulasztották annak igazolását, hogy a játék 1 valószínűséggel véget ér, így pedig a fenti okoskodás hiányos.