


Megoldás. Vegyünk egy szabályos n oldalú sokszöget, majd egy olyan kört, amelynek középpontja a sokszög középpontja, és metszi az oldalakat. A kör és a sokszög metszéspontjai által meghatározott $2n$ oldalú sokszögre szimmetria okok miatt teljesül, hogy szögei egyenlők, és hogy minden második oldala egyenlő hosszúságú. Most válasszuk meg a kör sugarát akkorára, amekkora az n -szög köré írt kör sugara, és kezdjük el csökkenteni a kör sugarát egészen addig, amíg el nem érjük a beírt kört.



Közben kísérjük figyelemmel a $2n$ oldalú sokszög kétféle oldalának arányát (a nevező legyen az az oldal, amely illeszkedik az n oldalú sokszög oldalára). Ez az arány kezdetben nulla, mert a köréírt körtől nagyon kicsit különböző sugarú kör esetében az n oldalú sokszög két szomszédos oldalát a közös csúcshoz képest két nagyon közeli pontban metszi, tehát a számláló nagyon kicsi, elfajuló esetben nulla. Majd a végéhez közeledve tart a végtelenhez, mert a beírt körhöz közeli kör egy oldalt két nagyon közeli pontban metszi, azaz a nevező nullához tart. Folytonosan mozgatva így a megfigyelt arány nullától végtelenig minden értéket felvesz, valamikor éppen $\frac{A_1 A_2}{A_2 A_3}$. Ebben az esetben a metszéspontok által megadott sokszög hasonló az $A_1 A_2 \dots A_{2n}$ sokszöghöz, mert minden szögük és a megfelelő oldalaik aránya is megegyezik. Az előbbinek van köréírt köre, hiszen úgy származtattuk, ezért az $A_1 A_2 \dots A_{2n}$ sokszögnek is van.