

Jelölje $\langle XYZ \rangle$ az X , Y és Z pontok által feszített síkot.

Először is belátjuk, hogy P középpontosan szimmetrikus O -ra. Legyen X tetszőleges pont P -ben, és tekintsünk egy OX -re illeszkedő S síkot. A $P \cap S$ síkmetszet a feltétel szerint O középpontú paralelogramma, így tartalmazza X -nek O -ra vonatkozó X' tükörképét. Ebből $X' \in P$ is következik, ami igazolja a középpontos szimmetriát.

Legyen P egy lapjának három egymást követő csúcsa (ilyen sorrendben) A , B és C , az AB és BC élek felezőpontjai X és Y . A pontok O -ra vonatkozó tükörképei értelemszerűen A' , B' , C' , X' és Y' .

Az XY egyenes P határát pontosan az XY szakaszban metszi, ezért $\langle OXY \rangle \cap P$ éppen az $XYX'Y'$ paralelogramma, vagyis az XY' szakasz P határára illeszkedik.

Másrésről az A , B , B' és C' pontok nem egy síkba esnek. Valóban, ha C' illeszkedik az $\langle ABB' \rangle$ -ra, akkor $C' \in \langle ABB' \rangle \cap \langle A'B'C' \rangle = A'B'$, ami nem lehet. Így viszont az XY' szakasz az $ABB'C'$ tetraéder két kitérő élének felezőpontját összekötő szakasz, amely a tetraéder, és így egyúttal P belsejében halad. Ezzel ellentmondásra jutottunk, így nem létezik ilyen P poliéder.

Imolay András (Bp., Fazekas M. Gyak. Ált. Isk. és Gimn., 11. évf.)
dolgozata alapján